


PRÉVENTION DES INFECTIONS



Des mesures pour éviter les piquûres d'aiguille



Les équipements sécuritaires

Les équipements sécuritaires possèdent un dispositif qui bloque l'accès à l'aiguille. Leur performance est reliée à la simplicité d'activation de la protection :

- **action automatique** lors du retrait de l'aiguille de la peau du bénéficiaire (mécanisme passif), c'est le dispositif le plus sécuritaire ;
- **action manuelle avant** le retrait de l'aiguille de la peau ;
- **action manuelle après** la sortie de l'aiguille de la peau.



- *Plusieurs établissements utilisent des dispositifs sécuritaires, car ils reconnaissent qu'il s'agit du moyen le plus efficace pour prévenir les piquûres accidentelles chez le personnel.*

UTILISATION ADÉQUATE

- **S'il faut appuyer sur un bouton** pour faire entrer l'aiguille à l'intérieur de la seringue ou rabattre une gaine protectrice pour recouvrir l'aiguille, enclenchez le mécanisme le plus tôt possible.
- **En aucun cas**, le dispositif de protection ne doit être modifié ou altéré.
- **Le stylo injecteur** conventionnel n'est pas un équipement sécuritaire. Il est indiqué uniquement pour l'autoadministration, c'est-à-dire la manipulation du stylo et des aiguilles par le bénéficiaire lui-même.

Se piquer avec une aiguille contaminée par le sang (ou se couper) représente un risque de transmission de microbes.



- *Des aiguilles souillées se retrouvent souvent au mauvais endroit : sous le mobilier, dans le lit du bénéficiaire, dans les sacs à déchets, dans le linge sale à la buanderie, etc.*

Objets piquants - Techniques sécuritaires


AVANT LE DÉBUT DE LA PROCÉDURE

- Si vous avez le choix, utilisez toujours un équipement sécuritaire.
- Assurez-vous que tout le matériel nécessaire se trouve à portée de main, y compris le contenant de disposition pour y jeter l'aiguille.
- Portez obligatoirement des gants pour effectuer un prélèvement sanguin ou installer un cathéter intraveineux. Les gants n'empêchent pas la piqûre accidentelle, mais si elle survient, ils essuient une partie du sang, diminuant ainsi le risque d'infection.
- Évaluez toujours la capacité du bénéficiaire à coopérer au soin. Informez-le pour éviter les mouvements brusques et, au besoin, prévoyez de l'aide pour l'immobiliser.



PENDANT LA PROCÉDURE

- Maintenez un contact visuel avec l'objet pointu jusqu'à son élimination.
- Ne recapuchonnez jamais une aiguille et ne l'enlevez pas avec les mains.
- Ne la déposez jamais sur une table, un lit, etc. (aucun dépôt transitoire).
- Ne circulez pas avec une aiguille à découvert dans les mains afin d'aller en disposer plus loin.
- Utilisez des pinces, jamais les doigts, pour manipuler lames, lancettes, etc., ou pour les ramasser par terre.



Contenants de disposition

INSTALLATION ADÉQUATE

- Si le contenant est fixé au mur, placez-le à une hauteur qui permet de bien voir l'ouverture : ouverture à 128 cm (50 po) du sol pour une utilisation en position debout et à 95 cm (37 po) en position assise.
- Assurez un accès facile, à portée de main et libre de tout encombrement.
- Permettez une bonne visibilité du niveau de remplissage et de l'indicateur de limite.
- Il est souvent difficile de trouver l'endroit idéal pour fixer un contenant au mur. Utilisez alors un contenant mobile.




- Une personne devrait être mandatée pour faire la tournée régulière des contenants et les remplacer dès qu'ils sont remplis aux trois quarts.

INSTRUMENTS PIQUANTS/TRANCHANTS

- Utilisez toujours un contenant dont la capacité et l'ouverture sont adaptées aux différents instruments.
- Jetez-y seringues, aiguilles, papillons (y compris les produits sécuritaires), rasoirs, lames de bistouri, etc., sans jamais séparer l'aiguille de la seringue.
- Vérifiez l'indicateur du niveau limite et ne remplissez pas le contenant au-delà.
- Assurez-vous que l'objet tombe à l'intérieur, entre autres les papillons qui accrochent facilement.
- Lorsque le contenant est plein, activez sa fermeture définitive et changez-le sans délai ; ne tentez pas de le forcer ou de pousser le contenu avec la main.
- Si le contenant est difficile d'accès, suggérez de changer son emplacement.

Piqûre accidentelle

- Nettoyez la plaie avec de l'eau et du savon doux (ne pas broser ou utiliser de solution irritante) et rincez à l'eau.
- Remplissez le rapport d'accident en y inscrivant le plus d'informations possible.
- Consultez la personne-ressource dans les deux heures suivant l'accident pour obtenir le suivi nécessaire et vous assurer que la maladie professionnelle soit reconnue si elle survient.



ASSTSAS  ensemble en prévention

Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS)
5100, rue Sherbrooke Est, bureau 950, Montréal (Québec) H1V 3R9
Téléphone : 514 253-6871 ou 1 800 361-4528
Télécopieur : 514 253-1443

www.asstsas.qc.ca