



Abréviations et symboles



Mise en garde

- Dans le cadre de l'administration des médicaments, l'utilisation des abréviations et des symboles est d'usage courant. Cependant, l'utilisation de plusieurs d'entre eux tend à disparaître en raison des erreurs de lecture et d'interprétation et des risques découlant de ces mauvaises lectures.
- *L'Institut pour l'utilisation sécuritaire des médicaments du Canada (ISMP)* présente dans la colonne « correction » des tableaux suivants, la meilleure façon de les utiliser dans la pratique.
- Vous êtes invités à consulter leur site Internet qui suit l'évolution de l'utilisation de ces abréviations et symboles, et où l'information est mise à jour régulièrement :

<http://www.ismp-canada.org>

Abréviations et symboles courants

Abréviation	Origine latine	Signification	Correction
a.	<i>auris</i>	oreille	Oreille
ad	<i>ad</i>	jusqu'à	
aq	<i>aqua</i>	eau	
ċ	<i>cum</i>	avec	
h	<i>hora</i>	heure	
npo ou NPO	<i>nil per os</i>	ne rien prendre par la bouche, ou par la voie orale	
Pr ou Rx	<i>præscriptio</i>	sur ordonnance	
q.	<i>quaque</i>	chaque	
rep.	<i>repetatur</i>	répéter	
sig.	<i>signa</i>	signez, écrivez	
stat.	<i>statim</i>	immédiatement	
>		plus que	Inscrire au long, car il peut y avoir confusion entre les symboles
≥		plus grand ou égal à	Inscrire au long
<		moins que	Inscrire au long
≤		plus petit ou égal à	Inscrire au long
≈		environ	Inscrire au long



Horaire (moment d'administration)

Abréviation	Origine latine	Signification	Correction
ac	<i>ante cibum</i>	avant les repas	Ne pas abrégé
am	<i>ante meridiem</i>	avant-midi	
ad lib	<i>ad libitum</i>	à volonté, au besoin	
bid	<i>bis in die</i>	2 fois par jour	
cc	<i>cum cibum</i>	pendant les repas	Ne pas abrégé
die	<i>die</i>	une fois par jour	Ne pas abrégé
hs	<i>hora somni</i>	au coucher	
pc	<i>post cibum</i>	après les repas	
pm	<i>post meridiem</i>	après-midi	
prn ou PRN	<i>pro re nata</i>	au besoin	
qd	<i>quaque die</i>	chaque jour, une fois par jour	Ne pas abrégé
qod ou QOD		un jour sur deux	Ne pas abrégé
qh	<i>quaque hora</i>	chaque heure	Utiliser « chaque heure »
q2h	<i>quaque dua hora</i>	toutes les 2 heures	
qid	<i>quarter in die</i>	4 fois par jour	
tid	<i>ter in die</i>	3 fois par jour	



Présentation

Abréviation	Origine latine	Signification	Correction
caps	<i>capsula</i>	capsule	
co		comprimé	
gtt	<i>gutta</i>	goutte	
supp		suppositoire	
susp		suspension	
c. à s.		cuillère à soupe	Ne pas abréger
c. à thé		cuillère à thé	Ne pas abréger



Quantité et volume

Abréviation	Origine latine	Signification	Correction
g		gramme	
gr		grain	
kg		kilogramme	
L		litre	
lb		livre	
mEq		milliéquivalent	
mcg (ou μg)		microgramme	Le symbole μg ne doit plus être utilisé, car il peut être pris pour « mg »
mg		milligramme	
ml		millilitre	
mmol		millimole	
mol		mole	
oz		once	
ss	<i>semis</i>	une demie	Utiliser « une demie »
U/UI		unité/unité internationale	Utiliser « unité »



Voies d'administration

(abréviations acceptées avec ou sans points)

Abréviation	Origine latine	Signification	Correction
id ou I.D.		intradermique	
im ou I.M. ou i/m		intramusculaire	
ir ou I.R. ou i/r		intrarectale	
iv ou I.V. ou i/v		intraveineuse	
od	<i>oculus dexter</i>	dans l'œil droit	Ne pas abrégé
os	<i>oculus sinister</i>	dans l'œil gauche	Ne pas abrégé
ou	<i>oculus uterque</i>	dans chaque œil	Ne pas abrégé
po, PO ou <i>per os</i>	<i>per os</i>	par la bouche	
sc ou S.C. ou s/c		sous-cutanée	
Sl ou s/l		sublinguale	
vag.		vaginale	



Quelques abréviations concernant la durée d'action d'un médicament

Abréviation	Origine latine	Signification	Correction
CD		libération contrôlée (<i>controlled delivery</i>)	
LA		longue action (<i>long action</i>)	
PA		action prolongée (<i>prolonged action</i>)	
SR		libération continue (<i>sustained release</i>)	
XL		action très prolongée (<i>extreme long action</i>)	

